FORMULA SHEET (tear off)

1A												3A	4A	5A	6A	7A	8A
1 H 1.01	2A																2 He 4.00
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.41	31 Ga 69.72	32 Ge 72.64	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc [98]	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	71 Lu 175.0	72 Hf 178.5	73 Ta 181.0	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
87 Fr [223]	88 Ra [226]	103 Lr [262]	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [266]												

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm [145]	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.2	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0
89 Ac [227]	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]

$N_A = 6.022 \times 10^{23}$ | $°C = (5/9)(°F - 32)$ | $°F = (9/5)(°C) + 32$

1 amu = 1.661×10^{-27} kg | $°C = K - 273.15$ | $K = °C + 273.15$

1 atm = 760 torr = 760 mm Hg | 1 atm = 1.013 bar | $pV = nRT$

$R = 0.08206$ L·atm/mol·K | 1 L·atm = 101.3 J

$R = 8.314$ J/mol·K | 1 J= 1 kg·m^2/s^2

$F = 96485.$ C/mol

$\ln(p) = - \frac{\Delta H°_{vap}}{T} + C$ | $\ln(p_2/p_1) = - (\Delta H°_{vap}/R) \{ (1/T_2) - (1/T_1) \}$

$p_A = X_A p_A°$ | $[B] = k p_B$ | $\Delta p_A = X_B p_A°$

$\Delta T_b = K_b m_B$ | $\Delta T_f = K_f m_B$ | $\Pi = [B]RT$

$H = U + pV$ | $G = H - TS$

$\Delta G_{rxn} = \Delta G°_{rxn} + RT \ln Q$ | $\ln K = - \Delta G°_{rxn}/RT$ | $K_p = K_C (RT)^{\Delta n}$

If $ax^2 + bx + c = 0$, then $x = \frac{- b \pm [b^2 - 4ac]^{1/2}}{2a}$

$K_a \cdot K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ (at T = 25°C) | $pH = pK_a + \log_{10}\{[base]/[acid]\}$

$\Delta G = - nFE_{cell}$ | $E_{cell} = E°_{cell} - (RT/nF) \ln Q$ | $\ln K = nFE°_{cell}/RT$

$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$ | $\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$ | $t_{1/2} = \ln 2/k$

$[A]_t = [A]_0/(1 + kt[A]_0)$ | $(1/[A]_t) = (1/[A]_0) + kt$ | $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$

$k = A e^{-Ea/RT}$ | $\ln k = \ln A - (E_a/R)(1/T)$ | $\ln(k_2/k_1) = - (E_a/R) [(1/T_2) - (1/T_1)]$